

トンガリボウシ

食味最高！甘くてジューシー！

- ▶ 定植後65日～70日で収穫となる中間タイプ
- ▶ 尖った形と味の良さが最大の特徴
- ▶ 葉肉は厚いが、柔らかくてジューシー
- ▶ 芯が短いので可食部も多い
- ▶ **虫には特に注意！**

- ▶ **栽培法は通常の寒玉キャベツと同様です。防除、収穫適期の見極めが大切になってきます。**



トンガリボウシ


食味最高！甘くてジューシー！

- ▶ トンガリボウシは「外葉が結球葉を包み巻き」しているので、生育中～後期から裂皮（葉割れ）が始まりますが、本来の裂球ではないので、慌てずに結球充実度を確かめてから、収穫に入る事。
- ▶ 高温期は収穫期の幅が狭く、株腐れ等も発生しやすくなります。薬剤防除、適期収穫に努めてください。また、カルシウム欠乏症の発生の恐れもあります。
- ▶ 春まき初夏どり栽培は、夏まき秋どり栽培に比べて尖りが強くなる。

トンガリボウシ

食味最高！甘くてジューシー！


- ▶ 作型表は目安です。産地で栽培されている65日～70日タイプ(中早生)のキャベツ作型に準じてください。



トンガリボウシ


食味最高！甘くてジューシー！

トンガリボウシは必ず葉割れします
葉割れが大きくなると完熟のサインです



トンガリボウシ

食味最高！甘くてジューシー！



芯が小さい！

☆ トンガリボウシの Snack サラダ ☆

